



クリニカル・インディケータとは？

医療の質を数で表し評価する指標の事。医療の過程や結果から課題や改善点を見つけ出し、医療の質の向上を目的とする。



○性別・年齢




○男女比



○入院期間




○転帰先




クリニカル・インディケータとは？

医療の質を数で表し評価する指標の事。医療の過程や結果から課題や改善点を見つけ出し、医療の質の向上を目的とする。


○性別・年齢



平均年齢
男性：78歳
女性：82歳
全体：81歳




○入院期間



平均在院日数：31.7日




○転帰先




クリニカル・インディケーターとは？

医療の質を数で表し評価する指標の事。医療の過程や結果から課題や改善点を見つけ出し、医療の質の向上を目的とする。


○性別・年齢



○入院期間



○転帰先




リハビリテーション効果(脊椎圧迫骨折)

FIMによる生活動作の評価

『FIM』とは？機能的自立度評価法

日常生活動作が自力でどの程度可能かを評価する方法


食事



- 介助
- 見守り
- 自立




清拭



- 介助
- 見守り
- 自立




トイレ動作



- 介助
- 見守り
- 自立



移動



- 自立
- 見守り
- 介助




リハビリテーション効果（肺炎）

FIMによる生活動作の評価


『FIM』とは？機能的自立度評価法

日常生活動作が自力でどの程度可能かを評価する方法


食事




清拭



トイレ動作



移動




リハビリテーション効果(頸部骨折)

FIMによる生活動作の評価


『FIM』とは？機能的自立度評価法

日常生活動作が自力でどの程度可能かを評価する方法


食事



清拭



トイレ動作



移動

